



MARCO CURRENTI
ORTOPEDIA - VETERINARIA

GUIDA INFORMATIVA
GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA
FISSAZIONE ESTERNA

GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE ESTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO

DOPO L'INTERVENTO IL CANE HA BISOGNO DI TRANQUILLITÀ E LA SUA DEAMBULAZIONE SARÀ INCERTA E PRECARIA:

- Lascialo riposare in un luogo appartato, silenzioso e privo di stimoli per evitare sovra-eccitazione.
- Fallo adagiare su un materassino morbido, direttamente poggiato sul pavimento, posiziona tappeti e stuoie per evitare che scivoli.
- Bada che non vi siano pericoli o che possa rimanere incastrato con il fissatore esterno (es. ringhiera, rete metallica dei balconi).

ATTIVITÀ FISICA

- Limita l'attività fisica per tutta la permanenza del fissatore esterno. È sconsigliato il gioco con altri cani per il rischio di traumi accidentali a carico del fissatore stesso.
- Se il cane manifesta oggettive difficoltà ad alzarsi nelle prime 48 ore, utilizza il sospendorio.
Per tutta la durata del primo mese dopo l'intervento, fai uscire il cane in passeggiata 3 volte al giorno e per 5-10 minuti alla volta.
- Dalla 4° settimana in poi, aumenta il tempo delle passeggiate: sempre 3 volte al giorno ma della durata di 10-15 minuti ciascuna.
- **Da evitare scale e salti:** nel caso di scalini da fare per entrare in casa, conduci sempre al guinzaglio corto.
- **Il cane deve poggiare l'arto operato anche se con zoppia:** in caso di assenza completa di carico, portalo subito a fare una visita di controllo.



GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE ESTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO

IL COLLARE ELISABETTIANO

- Se il cane lecca i punti di ancoraggio del fissatore (chiodi), potrebbero scatenarsi infezioni e infiammazioni. O peggio, potrebbe tentare di strappare il fissatore.
- Onde evitare spiacevoli conseguenze e ulteriori traumi, fai indossare al cane il collare elisabetiano (rigido, morbido o a salvagente) fino a rimozione del fissatore. Il disagio per il cane sarà solo iniziale e presto si abituerà a muoversi, mangiare e dormire come se nulla fosse.

MEDICAZIONI

- Nei punti in cui i chiodi sono inseriti nella cute, in seguito ai movimenti dell'animale, si produce siero: al pari di qualsiasi altra lesione cutanea, questi punti devono essere mantenuti puliti e asciutti per evitare rischi di infezione.
- Sottoponi il cane a medicazioni regolari la cui frequenza sarà stabilita di volta in volta dal Veterinario Ortopedico.

FARMACI

- Somministra scrupolosamente i farmaci (antibiotici e antidolorifici) i farmaci prescritti e accertati che il cane li ingerisca.
- Se dovessi avere difficoltà a trovare i farmaci prescritti, per nessun motivo puoi sostituirli con altri di tua iniziativa: riferisci al Veterinario che ti indicherà il giusto prodotto alternativo.



GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE ESTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO



VISITE DI CONTROLLO (PREVIO APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA)

- La prima visita di controllo va fatta a 3 giorni dalle dimissioni.
- La rimozione dei punti di sutura cutanei viene effettuata a 10 giorni dall'intervento.

STUDIO RADIOGRAFICO

- È necessario effettuare tre sessioni di studio radiografico in sedazione a 30, 60 e 90 giorni dall'intervento.
Il cane, se adulto, deve essere a digiuno da 10 ore. Se è cucciolo, a digiuno da 4 ore.
- Lascia l'acqua a disposizione fino a 30 minuti prima dell'arrivo in Clinica.