



MARCO CURRENTI
ORTOPEDIA - VETERINARIA

GUIDA INFORMATIVA
GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA
FISSAZIONE INTERNA

GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE INTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO

DOPO L'INTERVENTO IL CANE HA BISOGNO DI TRANQUILLITÀ E LA SUA DEAMBULAZIONE SARÀ INCERTA E PRECARIA:

- Lascialo riposare in un luogo appartato, silenzioso e privo di stimoli per evitare sovra-eccitazione.
- Fallo adagiare su un materassino morbido, direttamente poggiato sul pavimento, posiziona tappeti e stuoie per evitare che scivoli.
- La calcificazione ossea richiede circa 2 mesi e durante questo periodo è bene che il cane non corra, non salti e non si ruzzoli.
- **È preferibile che non giochi con gli altri cani:** seppur involontariamente, potrebbero provocargli traumi accidentali al sito di intervento. Durante questi mesi, infatti, oltre al rischio di ritardata o mancata consolidazione, è possibile la mobilizzazione degli impianti.

LA FERITA

- La ferita richiede di essere coperta con garza sterile e cerotto per i 5 giorni successivi l'intervento chirurgico.
- Per le prime 72 ore successive l'intervento, applica il ghiaccio per 10-15 minuti al di sopra della zona operata (borsa del ghiaccio, ghiaccio istantaneo, panetti blu).
- Ripeti la ghiaccio terapia per tre volte al giorno.
- Il gonfiore localizzato inizialmente a livello del ginocchio tenderà con le ore a scendere a livello della caviglia: applica quindi il ghiaccio sia a livello del ginocchio che della caviglia.



GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE INTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO

IL COLLARE ELISABETTIANO

- Il bendaggio non piace a nessun animale ma è fondamentale che il tuo cane non lo morda e non lo lecchi: tienilo sempre sotto controllo e fagli indossare il collare Elisabeth.
- L'uso di questo accessorio è raccomandato soprattutto durante le ore in cui non puoi tenerlo direttamente sotto il tuo controllo visivo, ad esempio di notte o quando sei fuori per lavoro.
- Il disagio per il cane sarà solo iniziale e presto si abituerà a muoversi, mangiare e dormire come se nulla fosse.

IL BENDAGGIO

- Controlla quotidianamente il bendaggio del cane e la porzione di zampa visibile: normalmente vengono lasciate scoperte le due dita centrali.
- Se noti che le due dita sono gonfie, potrebbe esserci un problema di circolazione: contattami subito per un controllo e per rimuovere e sostituire il bendaggio.
- Quando porti il cane a passeggio, il bendaggio deve essere protetto con due sacchetti di plastica che potrai rimuovere solo al rientro in casa: il bendaggio non deve sporcarsi e nemmeno inumidirsi.
- Nel caso in cui il tuo animale soggiorni all'esterno assicurati che la sua dimora sia asciutta e ben areata.



GESTIONE POST-OPERATORIA DELLA FISSAZIONE INTERNA

LA CORRETTA GESTIONE POSTOPERATORIA È IMPORTANTE TANTO QUANTO L'INTERVENTO CHIRURGICO

ATTIVITÀ FISICA

- Il giorno dopo l'intervento chirurgico, fai uscire il cane ogni 3-4 ore per passeggiate di 5 minuti: potrà espletare le sue funzioni fisiologiche (urina e feci) e man mano inizierà a ridursi il gonfiore dell'arto operato.
- Conduci sempre il cane a guinzaglio corto e passo lento e stimola il carico dell'arto operato massaggiandolo a livello della coscia.
- Dal secondo giorno in poi e per la prima settimana seguente, conduci fuori il cane per non più di per 5-10 minuti e incrementa gradualmente la durata delle passeggiate di 5 minuti ogni settimana per arrivare a 60 giorni dall'intervento a 30 minuti/ passeggiata.
- A 90 giorni, previo riscaldamento di 15 minuti al guinzaglio, inizia a concedere al cane attività fisica libera: inizialmente in luogo privo di stimoli successivamente anche con altri cani.

FARMACI

- Somministra scrupolosamente i farmaci (antibiotici e antidolorifici) prescritti e accertati che il cane li ingerisca.
- Se dovessi avere difficoltà a trovare i farmaci prescritti, per nessun motivo puoi sostituirli con altri di tua iniziativa: riferisci al Veterinario che ti indicherà il giusto prodotto alternativo.



VISITE DI CONTROLLO (PREVIO APPUNTAMENTO IN SEGRETERIA)

- La prima visita di controllo va fatta a 3 giorni dall'intervento per controllo della ferita e cambio della medicazione.
- Dopo 10 giorni potranno essere rimossi i punti di sutura cutanei.

STUDIO RADIOGRAFICO

- È necessario effettuare tre sessioni di studio radiografico in sedazione a 30, 60 e 90 giorni dall'intervento.
- Il cane deve essere a digiuno da 10 ore.
- Lascia l'acqua a disposizione fino a un'ora prima dell'arrivo in clinica.